BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"


(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL 34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL
Régisseur de recettes de la D.D.A.
C.C.P. Montpellier 5238-57

Numéro spécial



INSTRUCTIONS A NOS ABONNES


Nous recommandons à nos lecteurs de conserver soigneusement le présent numéro spécial qui leur apporte des renseignements auxquels ils devront se référer toute l'année:

- a) Carte et nomenclature des zones, grâce auxquelles ils peuvent situer exactement leur exploitation et utiliser les conseils de traitements localisés.
- b) Stades-repères des arbres fruitiers.

P233

Stades repères de la vigne

Dessins de M. BAGGIOLINI Stations fédérales d'essais agricoles, Lausanne




Bourgeon d'hiver

Bourgeon principal formé pendant l'année précédente, caractérisant la vigue dans son état de repos d'hiver. Oeil presque entièrement recouvert par deux écailles protectrices brunâtres.




Bourgeon dans le coton

Suit de près le début des pleurs ». Bourgeon gonflé dont les écailles s'écartent, protection cotonneuse brunâtre très visible.



Pointe verte

Oeil continuant à gonfler et à s'allonger, jusqu'à présenter la pointe verte constituée par la jeune pousse.




Sortie des feuilles

Apparition des feuilles rudimentaires rassemblées en rosette, dont la base est encore protégée par la « bourre », progressivement rejetée hors des écailles.



Feuilles étalées

Premières feuilles totalement dégagées présentant les caractères variétaux. Sarment herbacé nettement visible.




Grappes visibles

Grappes rudimentaires apparaissant au sommet de la pousse. 4-6 feuilles étalées.



Grappes séparées

Grappes s'espaçant et s'allongeant sur la pousse. Organes floraux encore agglomérés.




Boutons floraux séparés

Apparition de la forme typique de l'inflorescence à grappe, dans laquelle les boutons floraux sont nettement isolés. Détail de la figure : fleur en bouton.



Floraison

Les détails de la figure montrent comment la corolle, en forme de capuchon, se détache de sa base et se trouve repoussée vers le haut par les étamines. A la chute de la corolle, l'ovaire reste nu, tandis que les organes mâles se disposent en rayons autour de lui.



Nouaison


Ovaire commençant à grossir après la fécondation. Les étamines flétrissent, mais restent souvent fixées à leur point d'attache. Le petit fruit formé prend bientôt la forme du « grain » typique de la variété.

L'appréciation objective du développement momentané d'une vigne au moyen de l'échelle proposée ici demande une certaine attention, car l'évolution de l'organe considéré n'est pas forcément simultanée dans l'ensemble de la culture, pas plus d'ailleurs que sur une même plante.


On considérera donc comme déterminant le stade le plus fréquemment représenté sur les ceps de la vigne.

(Extrait de la « Revue romande d'Agriculture, de Viticulture et d'Arboriculture », 8, Nº 1, pp. 4-6, 1952.)

Stades-repères du poirier




Stades-repères du pommier



Stades repères du cerisier

Dessins de M. BAGGIOLINI



Bourgeon d'hiver

Caractérise l'état de repos de l'arbre Bourgeon entièrement brun, aigu et complètement fermé.



Bourgeon gonflé

Le bourgeon s'arrondit sensiblement et prend à son sommet une coloration vert clair.




Boutons visibles

Les écailles du sommet s'écartent et laissent voir les boutons verts encore rassemblés.




Les boutons se séparent

Les boutons se séparent entre eux,
tout en restant enveloppés à leur
base par les écailles du bourgeon;
la pointe blanche de la corolle est
visible.



On voit les étamines
Les premiers boutons s'ouvrent partiellement
et laissent apparaître les étamines.




Toutes les fleurs sont ouvertes, c'est la pleine floraison.




Chute des pétales

Les pétales flétrissent et commencent à tomper, les étamines s'enroulent.




Nouaison

Tous les pétales sont tombés; la base du calice commence à grossir; la nouaison a eu lieu.



Le calice tombe

La collerette du calice se dessèche, se détache et finit par tomber, laïssant le petit fruit à nu.



Jeune fruit

Le jeune fruit grossit rapidement et prend
bientôt sa forme normale.

L'appréciation objective de l'état du verger au moyen de l'échelle proposée ici demande une certaine attention, car l'évolution des bourgeons n'est pas forcément simultanée dans l'ensemble de la culture, pas plus d'ailleurs que sur un même arbre.

On considérera comme déterminant le stade le plus fréquemment représenté sur les arbres du verger.

NOMENCLATURE CANTONALE DES ZONES

PYRENEES-ORIENTALES

- PLAINE du ROUSSILLON. Argelès-sur-Mer, Millas, Perpignan (O. et E.), Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Thuir.
- 2. CONFLENT, VALLESPIR, FENOUILLEDES, HAUTES CORBIERES. Arles-sur-Tech, Céret, Latour-de-France, Olette, Prades, Prats-de-Mollo, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Vinça.
- 3. CAPCIR, CERDAGNE. Mont-Louis, Saillagouse.

AUDE

- AUDE ATLANTIQUE. Alaigne, Alzonne, Belpech, Carcassonne (E. et O.), Castelnaudary (N. et S.), Chalabre, Conques, Fanjeaux, Limoux, Montréal Saint-Hilaire, Salles-sur-l'Hers.
- 5. PAYS DE SAULT. Belcaire.
- 6. HAUTES CORBIERES. Axat, Couiza, Mouthoumet, Quillan.
- MONTAGNE NOIRE. Mas-Cabardès, Saissac, ainsi que les communes de Cabrespine, Castans, Citou, Lespinassière.
- 8. CORBIERES MINERVOIS. Capendu, Peyriac (moins les communes de Cabrespine, Castans, Citou, Lespinassière), Durban, Ginestas, Lagrasse, Lézignan, Tuchan.
- 9. NARBONNAIS. Coursan, Narbonne, Sigean.

GARD

- 17.-CEVENNES. Anduze, Alzon, Alès, Barjac, Bessèges, Genolhac, La Grand'Combe, Le Vigan, Lasalle, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Jean-du-Gard, Sumène, Trêves, Valleraugue.
- 18. GARRIGUES et VALLEES GARDOISES. Lédignan, Lussan, Quissac, Saint-Chaptes, Saint-Hippolyte, Saint-Mamert, Sauve, Uzès, Vézenobres.

- 19. BAS-RHONE. Aigues-Mortes, Beaucaire, Marguerittes, Nimes, Saint-Gilles, Sommières, Vauvert.
- 20. VALLEE DU RHONE. Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Villeneuve-les-Avignon.

HERAULT

- 10. MONTS DE LACAUNE. La Salvetat
- 11.- MONTAGNE NOIRE, SAINT-PONAIS, ORB. Bédarieux, Lunas, Saint-Gervais, Saint-Pons, Olargues, ainsi que les communes de Cassagnoles, La Caunette, Ferrals-les-Montagnes, Minerve.
- 12. BITERROIS. Agde, Béziers (1 et 2), Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Servian.
- 13.-LODEVOIS et GARRIGUES HERAULTAISES.- Aniane, Claret, Clermont-l'Hérault, Gignac, Les Matelles, Lodève, Saint-Martin-de-Londres.
- 14. BAS-RHONE LANGUEDOC. Castries, Frontignan, Lunel, Mauguio, Mèze, Montpellier (3), Sète.
- 15. CAUSSES et CEVENNES. Ganges, Le Caylar.
- 16. MINERVOIS. Olonzac (sauf les communes de Cassagnoles, La Caunette, Ferrals-les-Montagnes, Minerve).

LOZERE

- 21.-LOZERE MERIDIONALE.-Chanac, La Canourgue, Le Bleymard, Marvejols, Mende, Saint-Germain-du-Teil, Villefort, Barre-des-Cévennes, Florac, Le Massegros, Meyrueis, Le Pont-de-Montvert, Sainte-Enimie, Saint-Germain-de-Calberte.
- 22. AUBRAC GEVAUDAN.- Aumont, Châteauneuf-de-Randon, Fournels, Grandrieu, Langogne, Malzieu-ville, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans-la-Lozère, Saint-Chély-d'Apcher.

Stades-repères de l'abricotier

